

## Pigułka i alergia

Pigułka antykoncepcyjna może zwiększać ryzyko alergii. Zdaniem lekarzy z Uniwersytetu w Kuopio, dzieci matek, które w przeszłości stosowały doustne środki antykoncepcyjne, mogą być bardziej narażone na alergiczny nieżyt nosa.

Wskazują na to wyniki badań, które przeprowadzono na grupie blisko 1200 kilkuletnich dzieci.

Badania przeprowadzono wśród 564 zdrowych dzieci i 618 cierpiących na astmę. Wszystkie były w wieku 5 - 6 lat. Zdaniem fińskich lekarzy, u dzieci, których matki w ciągu roku przed ich poczęciem stosowały doustne środki antykoncepcyjne, prawdopodobieństwo wystąpienia alergicznego nieżytu nosa było aż o 2/3 wyższe, niż u tych, których matki pigułki nie stosowały. Przypadki te były częstsze u chłopców, niż u dziewczynek. Zależność wyraźniej widać w rodzinach, w których rodzice także cierpieli na choroby alergiczne.

Nie zaobserwowano, aby stosowanie pigułki miało wpływ na częstotliwość występowania astmy i alergii skórnych. Fińscy lekarze podkreślają, że kontrowersyjne wyniki wskazują na konieczność podjęcia dalszych badań w tej sprawie.

(Źródło: [www.interia.pl](http://www.interia.pl))